

Los investigadores evaluaron los niveles de estrona en 676 mujeres posmenopáusicas que fueron designadas al azar para recibir dosis fijas de estrógenos equinos conjugados con o sin una progestina.

Las 216 mujeres que consumieron más de 5.5 g de alcohol por día tuvieron aumentos 12.3 y 11.9 por ciento más altos en los niveles de estrona, respectivamente, que las 235 no bebedoras y 225 mujeres que bebían hasta 5.5 g/día.

Contrariamente, los niveles de estrona disminuyeron en un 40.5 por ciento entre las 88 fumadoras actuales en comparación con las 348 que nunca fumaron. Las concentraciones de

estrona disminuyeron en sólo un 1.4 por ciento entre las 240 ex fumadoras, indican los hallazgos del estudio.

El impacto del alcohol y el hábito de fumar en los niveles séricos de estrona no se vio afectado por el tipo de tratamiento hormonal en las mujeres que lo estaban recibiendo, comentan los investigadores.

“Los niveles de estrógeno logrados con el uso de terapia hormonal podrían relacionarse o con su toxicidad o con su eficacia”. Por lo tanto, sería clínicamente relevante comprender los factores que influyen en estos niveles”, concluyen Mei-Hua y colaboradores.

PERLAS

Lo mejor de ORGYN Revista en Línea 2007

Issue 26: 8 ene 2008

Fuente: ORGYN.com

Fertilidad

- La aspirina en la FIV: el debate continúa (edición del 16 de octubre): “Nuestros resultados sugieren que cualquier alteración recomendada de la práctica actual podría ser prematura”.
- Resultados de FIV en mujeres de 45 años o más (6 de febrero): el éxito de la FIV “está limitado al grupo de mujeres de 45 años con reserva ovárica normal y una respuesta de al menos cinco ovocitos durante la hiperestimulación ovárica”.
- ¿Cabezas o colas para ICSI? (24 de julio): “Inyectar espermatozoides de cola en el ovocito no es menos efectivo en términos de fertilización y tasas de implantación que el método tradicional de inyectar espermatozoides de cabeza”.

Menopausia

- La depresión durante la transición menopáusica (20 de febrero): Los hallazgos de un

estudio muestran que las mujeres con trastorno bipolar experimentaron un significativo aumento en la frecuencia de episodios depresivos durante la transición menopáusica.

- Los pólipos endometriales y la menopausia (21 de agosto): “Los resultados de este estudio sugieren que los pólipos deberían extraerse en todas las mujeres mayores y si se presenta sangrado posmenopáusico. En las mujeres sin factores de riesgo, tal vez sería posible evitar la extracción rutinaria de modo tal de minimizar los riesgos quirúrgicos y los costos”.
- Cambios corporales relacionados con la menopausia (12 de junio): “[...] Las asociaciones de estrógeno más progestinas disponibles en el mercado no ejercen efectos importantes en el control del peso en las mujeres posmenopáusicas”.

Anticoncepción

- Asesoramiento sobre anticoncepción y embarazo en clínicas de diabetes (1 de mayo):