

deberían promover e implementar protocolos médicos fundamentados en la medicina basada en la evidencia”.

Los investigadores sugieren que la información presentada durante la educación sexual en

las escuelas, y en las facultades de medicina y en los programas de capacitación para profesionales del ámbito médico, también debería ser revisada (y de ser necesario mejorada) para asegurar que los falsos conceptos no se divulguen.

PERLAS

HPV de alto riesgo en casi una de cada 16 mujeres mayores estadounidenses

Examinan la prevalencia de infección del virus de papiloma humano (HPV) entre mujeres mayores estadounidenses.

Fuente: *Obstetrics and Gynecology* 2008; 112: 979-988

MedWire News: casi una de cada 16 mujeres mayores estadounidenses porta tipos de alto riesgo del virus de papiloma humano (HPV), sugiere una investigación.

Stacy Lindau (Universidad de Chicago, Illinois, EE.UU.) y colaboradores calcularon la prevalencia del HPV de alto riesgo utilizando una muestra de 1.550 mujeres residentes en la comunidad de 57 a 85 años de edad, que fueron extraídas de una muestra de probabilidad representativa a escala nacional.

Se llevaron a cabo entrevistas en el hogar y se recolectaron biomediciones –incluyendo especímenes vaginales recolectados por las mujeres– entre los años 2005 y 2006. Las 1.010 muestras apropiadas para captación fueron analizadas para 13 tipos de alto riesgo de HPV.

La prevalencia de HPV en la población estimada de acuerdo con las características sociodemográficas fue del seis por ciento, la

que según los investigadores corresponde a 1.8 millón de mujeres estadounidenses utilizando la información del censo de 2006.

Entre las mujeres con HPV de alto riesgo, el 63 por ciento tenía infecciones de tipos múltiples.

Uno o más de los cuatro genotipos incluidos en la vacuna cuadrivalente contra el HPV, HPV-6, 11, 16 y 18, fueron detectados en el 27.2 por ciento de las mujeres con HPV de alto riesgo, aunque no se hallaron casos de HPV-11.

La positividad al HPV de alto riesgo se asoció con ser soltera, fumadora, haber tenido dos o más compañeros sexuales, haber tenido cáncer o una histerectomía.

Los investigadores dicen: “Los factores de riesgo en las mujeres más jóvenes también son correlatos significativos de HPV de alto riesgo en las mujeres mayores”.