

Aumentos generacionales en cánceres anal, vulvar y vaginal relacionados con HPV

Analizan tendencias temporales y generacionales en la incidencia de cáncer anal y otros cánceres relacionados con el virus de papiloma humano en el sudeste de Inglaterra.

Fuente: *British Journal of Cancer* 2009; 100: 527-531

MedWire News: un estudio del Reino Unido ha descubierto que la incidencia de cáncer anal ha aumentado tanto para los hombres como para las mujeres nacidos desde 1940 en adelante, y se observaron patrones generacionales similares para el cáncer de vulva y de vagina.

“Los patrones generacionales observados en las tasas de las cohortes presentes en este trabajo [...] son compatibles con la hipótesis de que los cambios en las prácticas sexuales son un factor importante de contribución a los aumentos de cánceres anogenitales además del de cuello uterino”, comentan David Robinson (King’s College London, R.U.) y colaboradores.

Los investigadores identificaron pacientes diagnosticados entre 1960 y 2004 con cáncer de ano, vulva, vagina, cuello del útero o de pene del Thames Cancer Registry.

En su investigación hallaron un aumento continuo en las tasas temporales de cáncer anal tanto en hombres como en mujeres, con aumen-

tos de 0.79 a 1.06 cada 100.000 hombres y 0.45 a 1.18 cada 100.000 mujeres de 1960-1964 a 2000-2004, respectivamente.

Las tasas de las cohortes de cáncer vaginal también aumentaron a lo largo de las generaciones recientes, de 0.42 a 0.82 cada 100.000 para las incluidas en las cohortes de 1940 y 1960, respectivamente. El patrón es similar para el cáncer vulvar –con tasas de 1.65 que aumentaron a 2.51 cada 100.000 para las nacidas en la década de 1960.

Robinson y cols. dicen que la drástica caída en las tasas periódicas de cáncer de cuello uterino entre 1985-1990 y 2000-2004 (12.68 a 6.66 cada 100.000) refleja la introducción del programa de detección del National Health Service alrededor de 1988.

“Los programas de vacunación contra el virus de papiloma humano [...] también podrían ayudar a reducir la incidencia de cánceres en estos otros sitios”, dijo Robinson.